

SUVINISU SAAGISTRUKTUUR OLENEVALT SORTIDE BIOLOOGILISTEST ERIOMADUSTEST JA KASVUTINGIMUSTEST

O. PRIILINN,

põllumajandusteaduste kandidaat

NLKP Keskkomitee septembri- ja veebruari-märtsipleenum otsustasid pidada vajalikuks igati arendada teraviljamajandust ning eriti kõige väärtuslikuma toiduteravilja — tali- ja suvinisu — tootmist. Veebruari-märtsipleenumi otsuses on ette nähtud teravilja tootmise tunduv suurendamine uudis- ja jäätmaade ülesharimise teel. Samas juhitakse tähelepanu vajadusele märksa tõsta teraviljakultuuride saagikust, mis on olnud ja jääb teravilja tootmise suurendamise peamiseks abinõuks.

Partei ja valitsuse poolt seatud ülesannete edukas täitmine saagikuse tõstmise alal nõuab kõrge saagi kujunemise teadlikku juhtimist. Sotsialistliku põllumajanduse arenemise tingimustes ei või agrotehnika küsimusi lahendada lihtsalt antud kultuuri suhtes tervikuna, arvestamata iga kultuuri eri sortide bioloogilisi iseärasusi. Ei tohi unustada seda, et saagikuse tõstmise reserveid täielikum ärakasutamine ei ole võimalik juhindudes ainult üldistest empiirilistest agrotehnilistest reeglitest ja neid mehaaniliselt rakendades erinevates tingimustes, arvestamata sortide vajaduste erinevusi ja kasvutingimusi. Mida sügavamalt tungime taimede arenemise seaduspärasustesse ja mida rohkem avastame eri sortides peituvaid reserve, seda paremaid tulemusi saakide tõstmise alal saavutame taimede kasvu ja arenemise suunava juhtimisega.

Alljärgnevalt käsitletakse uurimust, mille ülesandeks oli selgitada Eesti NSV-s suurte suvinisusaakide kasvatamise bioloogilisi aluseid ja taimede bioloogiliste omaduste arvestamise alusel teaduslikult põhjendada sordiagrotehnika rakendamise vajadust. Tuuakse ära põhilisemad tulemused suvinisu saagikuse tõstmise küsimuste uurimise alalt seoses taime nende orgaanite ja osade kujunemise suunava mõjutamisega, milledest moodustub saak. Töös iseloomustatakse Eesti NSV-s rajoonitud ja Jõgeva Riiklikus Sordiretusjaamas aretatud perspektiivsete suvinisusortide saagi kujunemist erinevates kasvu- ja arenemistingimustes, lähtudes taimede stadiaalse arenemise teooriast. Eksperimentaalsed uurimised teostati Jõgeva Riiklikus Sordiretusjaamas ja Eesti NSV Teaduste Akadeemia Taimekasvatuse Instituudi Tallinna Eksperimentaalbaasis aastail 1951—1953. Töötati läbi ka Eesti NSV riiklike sordivõrdluskatsepunktide 1950. ja 1951. aasta aruanded.

Uurimise alused

Teraviljakultuuride saagi suuruse pinnaühikult määravad põhiliselt järgmised näitajad: 1) taimede arv pinnaühikul, 2) produktiivne võrsumine, 3) pähkute arv peas, 4) terade arv pähikus, 5) 1000 tera kaal.

Neid näitajaid nimetatakse saagistruktuuri elementideks ehk saagielementideks (8, 3, 11, 9).

Saagielementide kujunemise uurimise aluseks on akadeemik T. D. Lõsenko poolt välja töötatud taimede stadiaalse arenemise teooria, sest „arenemisjärkude alusel kujunevad taime osad ja organid, tema mitmesugused tunnused ja omadused. Mõned neist on ainult ühe teatava arenemisjärgu läbimise tulemus, teised on aga omased mitmele või koguni kõikele arenemisjärkudele” (2).

Saagielementide kujunemine on lahutamatu seotud taimede kasvu- ja arenemistingimustega. Produktiivsete kõrte arv pinnaühiku kohta, pähkute arv peas, terade arv pähikus, 1000 tera kaal jne. on kasvu- ja arenemisprotsesside kulgemise tulemus taimede arenemise järkjärgulistes staadiumides. Suurte saakide saamiseks on vajalik teada saagielementide arenemiseks vajalikke tingimusi, et teadlikult mõjutada nende kujunemist meile soovitavas suunas.

Nõukogude teadlaste poolt taimede stadiaalse arenemise teooria alusel teostatud uurimised on näidanud, et teraviljade ja nende hulgas ka suviniisu pea algme diferentseerumine toimub valgusestaadiumis (4, 10, 5, 6, 7). Pea arenemine on seotud stadiaalsete protsessidega taimel. Jarovisatsioonistaadiumi täieliku läbimise ja valgusestaadiumi alguse morfoloogiliseks näitajaks loevad paljud autorid kasvukuhiku väljavenimist ja diferentseerumist, kuid on ka teisi arvamusi. A. K. Fjodorovi (12) andmeil võib arenemise valgusestaadium alata ka enne kasvukuhiku diferentseerumist. Kirjanduses avaldatud erinevate katsetulemuste ja uurimuste põhjal võib järeldada, et valgusestaadiumi algust ja lõppu ei ole alati võimalik siduda kindlate morfoloogiliste muutustega kasvukuhikus. Valgusestaadiumi kestus kõigub suurtes piirides, olenevalt sordist ja kasvutingimustest.

Taimede morfogeneesi ja saagielementide kujunemise uurimise tähtsus seisab selles, et ta annab meile taimel toimuvatest protsessidest ja nende kulgemise intensiivsusest erinevatel arenemisstaadiumidel ja välistingimustes ettekujutuse, mida saab kasutada suurte saakide agrotehnika teaduslikuks põhjendamiseks ning efektiivsete agrotehniliste võtete väljatöötamiseks.

Saagistruktuuri võrdlev uurimine sordivõrdluskatsetes

Suviniisusortide bioloogiliste omaduste iseloomustamiseks ja Eesti NSV-s suurte saakide saamise bioloogiliste aluste selgitamiseks viidi Jõgeva Riiklikus Sordiaretusjaamas 1951. ja 1952. aastal teostatud sordivõrdluskatsete juures autori poolt läbi saagistruktuuri uurimine. Katsed, mis teostati kõrgel agrofoonil, rajati põldheina järel, erinevatel väetisfoonidel. Katsed rajati neljas korduses katselappidele pindalaga 50 m². Külvi teostati käsiplaneediga, reavahega 12,5 cm, külvinormiga 650 idanevat tera ühele ruutmeetrile.

Pärast orase täielikku tärkamist eraldati igalt korduselt kolm proovilappi, igaüks pindalaga $\frac{1}{6}$ m². Taimede arv proovilappidel loeti pärast täielikku tärkamist ja enne koristamist. Võetud proovivihke kasutati saagistruktuuri analüüsimisel. Pea produktiivsus ja teised tunnused määrati 100 pea analüüsi alusel.

1951. aastal korraldatud katsetel anti katsepõllule kevadel enne kultu-

veerimist 4,5 ts granuleeritud superfosfaati, 1,7 ts kaalisoola ja 1,1 ts ammooniumsulpeetrit hektari kohta.

1951. aastal võeti uurimise alla 7 sorti: vabariigi rajoonitud sordid „Diamant” ja „Kauka” ning Jõgeva Riiklikus Sordiaretusjaamas aretatud perspektiivsed sordid „0888”, „01926”, „01302”, „01926.4” ja „01923.11”. Peale nende uuriti ka sortidevahelisest ristamisest tuultollemise teel saadud „Diamandi” ja „Kauka” hübriidi saagistruktuuri kujunemist.

1952. aastal uuriti saagistruktuuri kahel erineval väetisfoonil — tavalisel ja kõrgemal.

Tavalisele foonile anti eelmise aasta sügisel 2,0 ts superfosfaati ja 1,0 ts kloorkaaliumi hektari kohta ning külviaasta kevadel enne kultiveerimist täiendavalt 1,0 ts ammooniumsulfaati ja 1,5 ts orgaanilis-mineraalseid graanuleid (0,75 ts superfosfaati ja 0,75 ts hästilagunenud turvast). Seega sai iga hektar 2,75 ts superfosfaati, 1,0 ts kloorkaaliumi, 1,0 ts väävelhaput ammooniumi ja 0,75 ts turvast.

Kõrgemale foonile anti kevadel enne kultiveerimist 3,0 ts superfosfaati, 1,5 ts kloorkaaliumi, 1,5 ts väävelhaput ammooniumi ja 2,25 ts orgaanilis-mineraalseid graanuleid hektari kohta.

1951. aasta vegetatsiooniperioodi ilmastikuolud erinesid tunduvalt ilmastikuoludest 1952. aasta vegetatsiooniperioodil. 1951. aastal oli ajavahemikul tärkamisest kuni võrsumiseni tavalisest madalam temperatuur, võrsumisest kuni kõrdumiseni aga soe ja kuiv ilm. Loomise-eelsel perioodil ja loomise ajal valitses soodne veerežiim. Tera valmimise ja küpsemise perioodil domineerisid kõrge temperatuur ja põuatingimused. 1952. aasta vegetatsiooniperioodil oli temperatuur madal ja sademeid palju, eriti suve teisel poolel. Öhu ja mulla suur niiskus pikendas suvinisu valmimist ja küpsemist.

1951. aasta katses saadi kõrgeid saake, mis ulatusid 34,2—45,4 tsentnerini hektari kohta, kusjuures kõige madalama saagi andis „Diamant”.

Kõige kõrgema terasaagi andis perspektiivne sort „Jõgeva 01926”.

Teised perspektiivsed sordid jäid nii saagilt kui ka muude näitajate poolest „Jõgeva 01926-st” maha. Sortide üksikasjaline iseloomustus on ära toodud tabelis 1.

Saagistruktuuri analüüsi andmeist nähtub, et eri sordid, vastavalt nende bioloogilistele ja füsioloogilistele omadustele, annavad ühtedes ja samades tingimustes erineva struktuuriga saagi.

1951. aastal uuriti ka hübriidseemnete saagistruktuuri kujunemist.

On teada, et vaba sortidevahelise ristamise tulemusena rikastub taimede pärilikkus ja tõuseb elujõulisus, mille tulemusena suureneb ka saagikus. Senini on aga vähe uuritud hübriidseemnete saagi kujunemist ja pole selgitatud, missuguste saagielementide intensiivsema väljaarenemise tõttu saadakse hübriidseemne enamsaak emasortidega võrreldes.

Hübriidseemnete saamiseks külvati Jõgeval 1950. aastal ridadena tolmutajate segusse emasordid „Diamant” ja „Kauka”. Isasortidena külvati mõlema sordi tolmutamiseks ühed ja samad sordid, nimelt „Jõgeva 0888”, „Jõgeva 01926”, „Moskovka 48”, „Flora 5”, „Diamant” ja „Kauka”. Kohe pärast loomist teostati emasortide kastreerimine. Sellega loodi tingimused valikviljastumiseks.

Uurimine näitas, et taimede hübriidne loomus ja suurem elujõulisus põhjustasid peaaegu kõikide saagielementide intensiivsema väljaarenemise ja seega saagi tõusu. „Diamandi” ja „Kauka” hübriidseeme kindlustas taimede suurema seisutiheduse seemnete parema tärkavuse tõttu, andes samuti pea suurema produktiivsuse emasortidega võrreldes. Pea produktiivsus kasvab „Diamandi” hübriidil terade arvu ja nende kaalu suurenemise, „Kauka” hübriidil aga terade kaalu suurenemise tulemusena.

1952. aasta katsetes oli terasaak tavalisel foonil 18,1 — 19,9 ts ja kõrge-

Suvinisusortide saagistruktuur 1951. aastal

Sordid	„Diamant“	„Kauka“	„Jõgeva 0888“	„Jõgeva 01302“	„Jõgeva 01926“	„Jõgeva 01926.4“	„Jõgeva 01923.11“
Näitajad							
Taimede arv pärast täielikku tärkamist 1 m ² kohta	472	483	465	433	536	527	459
Tärkavus (%)	72,6	74,0	71,5	66,6	82,5	81,1	70,6
Taimede arv koristamise eel 1 m ² kohta	417	428	431	404	494	474	413
Koristamiseni säilinud taimede %	88,4	88,6	92,7	93,1	92,0	89,9	90,0
Produktiivsete kõrte arv 1 m ² kohta	486	483	514	462	559	555	540
Üldine võrumine	1,22	1,20	1,24	1,22	1,20	1,25	1,39
Produktiivne võrumine	1,16	1,14	1,19	1,14	1,13	1,18	1,30
Taimede keskmine kõrgus (peavõrse pikkus) cm	109,8	115,0	109,9	109,5	113,3	111,8	112,4
Pea keskmine pikkus cm	7,7	7,1	7,9	7,9	6,6	6,9	6,8
Keskmine pähikute arv peas	13,5	14,0	13,0	14,0	12,3	11,9	12,3
Pea tihedus	16,2	18,3	15,2	16,5	17,1	15,8	16,6
Keskmine õite arv peas	43,0	44,3	44,9	46,4	41,9	40,6	41,2
Keskmine õite arv pähikus	23,6	24,7	23,5	26,4	24,2	22,7	23,4
Keskmine terade arv pähikus	3,18	3,16	3,45	3,31	3,41	3,41	3,35
Keskmine terade arv pähikus	1,75	1,76	1,81	1,89	1,97	1,91	1,90
Keskmine terade kaal pea kohta g	0,69	0,77	0,70	0,75	0,84	0,77	0,80
1000 tera kaal g	29,2	31,1	29,8	28,4	34,7	33,9	34,2
Terasaak ts/ha	34,2	35,6	38,2	34,8	45,4	42,6	40,8
Terasaak ± standardist („Diamant“) ts/ha	0,0	+1,4	+4,0	+0,6	+11,2	+8,4	+6,6
Bioloogiline saak ts/ha	33,5	37,2	36,0	34,6	47,0	42,7	43,2
Bioloogiline saak ± majanduslikust saagist	-0,7	+1,6	-2,2	-0,2	+1,6	+0,1	+2,4

Tabel 2

„Diamandi“ ja „Kauka“ hübriidi saagistruktuur emasortidega võrreldes

Sordid	„Diamandi“ hübriid	„Diamant“	„Kauka“ hübriid	„Kauka“
Näitajad				
Tärkavus (%)	83,2	72,6	82,5	74,0
Produktiivsete kõrte arv 1 m ² kohta	527	486	515	483
Taimede keskmine kõrgus (peavõrse pikkus) cm	113,5	109,8	114,2	115,0
Pea keskmine pikkus cm	7,9	7,7	7,3	7,1
Keskmine pähikute arv peas	13,8	13,5	13,8	14,0
Keskmine terade arv peas	24,9	23,6	24,2	24,7
Keskmine terade kaal pea kohta g	0,76	0,69	0,79	0,77
1000 tera kaal g	30,5	29,2	32,6	31,1
Terasaak ts/ha	36,6	34,2	38,9	35,6

mal foonil 28,0 — 30,2 ts hektari kohta. Järelikult saadi kõrgemal foonil keskmiselt 10 ts/ha võrra suurem saak kui tavalisel foonil. Mõlemal foonil ületasid kõik sordid „Diamandi“, kuid enamsaak osutus 1951. aastaga võrreldes väga väikeseks. Seda saab osaliselt seletada sellega, et „Diamant“ näib olevat teistest sortidest niiskusenõudlikum ja võib ka paremini taluda liigniiskust, mis esines 1952. aastal.

Saagistruktuuri analüüsi andmed näitavad, et kõrgemal foonil arenesid paremini välja kõik saagielemendid, kuid erineval määral, olenevalt sortide

bioloogilistest omadustest. Kõrgemal agrofoonil oli kõikide sortide kõrte seis tihedam ja pea produktiivsus suurem kui tavalisel foonil. „Diamandi” väiksem saak mõlemal foonil oli tingitud peamiselt pea väiksemast produktiivsusest.

Saagistruktuuri põhilised näitajad on toodud tabelis 3.

Tabel 3

Suvinisusortide saagistruktuur 1952. aastal

Näitajad	Foonid	Sordid					
		„Diamant”	„Kauka”	„Jõgeva 0888”	„Jõgeva 01926”	„Jõgeva 01926.4	„Jõgeva 01923.11
Tärkavus (%)	tavaline	85,1	79,2	80,5	82,5	72,2	86,0
	kõrgem	89,4	82,6	80,5	86,5	83,2	85,4
Produktiivsete kõrte arv koristamisel 1 m ² kohta	tavaline	418	403	414	410	386	432
	kõrgem	488	456	471	491	468	481
Taimede keskmine kõrgus (peavõrse pikkus) cm	tavaline	73,1	64,8	70,0	72,8	66,2	65,8
	kõrgem	73,4	67,2	77,2	80,0	60,2	71,5
Keskmine pähekute arv peas	tavaline	11,1	11,4	10,1	10,3	10,5	10,4
	kõrgem	11,2	11,7	11,4	10,9	10,9	10,5
Keskmine terade arv peas	tavaline	17,9	16,8	16,9	17,4	17,9	16,7
	kõrgem	18,9	19,5	20,3	19,3	19,2	18,0
Keskmine terade kaal pea kohta g	tavaline	0,51	0,55	0,48	0,54	0,57	0,53
	kõrgem	0,63	0,70	0,64	0,67	0,71	0,65
1000 tera kaal	tavaline	28,5	32,7	28,4	31,0	31,8	31,7
	kõrgem	33,3	35,9	31,5	34,7	36,9	36,1
Terasaak ts/ha	tavaline	18,1	19,7	18,3	19,8	19,2	19,9
	kõrgem	28,0	29,4	28,9	29,9	30,2	28,9

Külviaja mõju taimede arenemisele ja saagistruktuuri kujunemisele

Suvinisu varase külvamise saakitõstev mõju on Eesti NSV-s tõestatud rohkearvuliste katsetega (E. Haller) ja praktiliste kogemustega, kuid pole uuritud erinevate külviaegade mõju taime nende organite ja osade arene-



Joon. 1. „Kauka” pea algme arenemine 15. juuniks taimedel esimesest külviajast 25. päeval pärast tärkamist. Diferentseerumine pähekuteks on lõppenud.



Joon. 2. „Kauka” pea algme arenemine 15. juuniks taimedel teisest külviajast 16. päeval pärast tärkamist. Diferentseerumine pähekuteks kestab.

misele, millest moodustub saak. Seega ei ole varase külvi mõjule antud bioloogilist põhjendust taimede stadiaalse arenemise ja taimede produktiivsuse kujunemise seisukohalt. Samuti ei ole andmeid sortide reageerimise kohta külviajale.

Nende küsimuste valgustamiseks rajati 1952. ja 1953. aastal katsed kolme sordiga: „Diamant”, „Kauka” ja „Jõgeva 01926”. Esimene külv teostati varakevadel esimesel külvivõimalusel, teine ja kolmas 10-päevaste vahega. Pärast teise lehe ilmumist kuni loomiseni uuriti iga 3—5 päeva tagant kasvukuhiku diferentseerumist ja pea algme kujunemist (joon. 1—3).

Vaatlused ja uurimised näitasid, et olenevalt erinevatest temperatuuri, päeva pikkuse ja veerežiimi tingimustest, mis luuakse eri külviaegadega, toimub ka taimede kasv, arenemine ja saagielementide kujunemine. Tingimustest valgusestaadiumis oleneb pea algme kasvu ja arenemise tempo ning pea produktiivsus. Eesti NSV kliimaatilistes tingimustes esineb hiliskevadeti sageli põuda, mis põhjustab hiliste külvide pea algme kiiret arenemist, kuid kidura kasvu tõttu pea produktiivsuse langust. Varase külvi korral langeb suviniisul valgusestaadiumi läbimine ja pea algme arenemine pea produktiivsuse kujunemise suhtes soodsamatesse tingimustesse, võrreldes hilisemate külvidega. Kasvu ja arenemist soodustab madalam temperatuur, ühtlasem veerežiim ja lühem päev.

Saagistruktuuri analüüsi andmed näitasid, et kõrgem saak esimesel külvi ajal hilisemate külvidega võrreldes kindlustatakse produktiivsete kõrte tihedama seisu ja terade suurema kaalu tõttu. Külvi hilinemisel langes tunduvalt seemnete tärkavus ja taimede võrsumine. Samal ajal suurenes mitteproduktiivsete kõrte arv pinnaühiku kohta. Külvi hilinemisel langes „Jõgeva 01926” terasaak suhteliselt rohkem kui „Diamandi” ja „Kauka” terasaak.

Külvitiheduse mõju saagistruktuuri kujunemisele

Olenevalt sortide agrobioloogilistest iseärasustest ja kasvutingimustest on kõrgete saakide kindlustamiseks vajalik koos teiste agrotehniliste võetega diferentseerida ka külvinorme. Eesti NSV-s on veel vähe uuritud külvinormide mõju suviniisusortide saagi kujunemisele. Seoses maaviljeluse heinaväljasüsteemi juurutamisega ja põllunduskultuuri üldise tõusuga suureneb vajadus uurida külvitiheduse mõju saagi kujunemisele erinevates kasvutingimustes.

Külvitiheduse mõju uurimiseks erinevatel agrofoonidel „Diamandi”, „Kauka” ja „Jõgeva 01926” saagistruktuuri kujunemisele rajati katsed madalal ja kõrgemal agrofoonil. Külvati 500, 600, 700 ja 800 idanevat tera 1 m² kohta.

Uurimine näitas, et sordile ja kasvutingimustele vastav optimaalne külvinorm, mis võimaldab sordiomaduste täielikumat ärakasutamist saagikuse tõstmiseks, on sordiagrotehnika kompleksis üheks tähtsamaks teguriks.



Joon. 3. „Kauka” pea algme arenemine 15. juuniks taimedel kolmandast külviajast 9. päeval pärast tärkamist. Valgusestaadiumi algus; algab kasvukuhiku väljavenimine ja pähikuteks diferentseerumine.

Katsetes suurenes madalal agrofoonil külvinormi tõstmisega kõikide sortide terasaak. Kõrgemal foonil suurenes külvinormi tõstmisega tunduvalt „Kauka” terasaak, kuid ei tõusnud „Diamandi” ja „Jõgeva 01926” saak. Sortide niisuguse erinevuse üheks põhjuseks võib lugeda „Kauka” nõrka võrsumist. Madalama külvinormi rakendamisel andis „Kauka” liiga hõreda kõrteseisu. Kaaluliselt ühesuguse külvinormi kasutamisel on pealegi „Kauka” terade arv pinnaühiku kohta tunduvalt kõrgema 1000 tera kaalu tõttu väiksem kui „Diamandil”. Tootmispraktikas aga sageli ei arvestata külvinormide kasutamisel neid sordi iseärasusi.

Kui külvinormi suurendamisega kõrte arv pinnaühikul tõusis, siis pea keskmine produktiivsus langes pidevalt. Kõrteseisu tiheduse suurendamisel teatud piirini (optimumini) tõuseb terasaak vaatamata pea produktiivsuse samaaegsele langemisele. Kõrteseisu tiheduse edasisel suurendamisel aga terasaak enam ei tõuse, vaid hakkab langema pea produktiivsuse järsu vähenemise tõttu. „Kauka” pea produktiivsus langes külvinormi suurendamisel tunduvalt vähem kui „Diamandi” ja „Jõgeva 01926” pea produktiivsus. Arvestades katsete tulemusi ja tootmispraktika kogemusi, on vajalik välja selgitada külvinormide suurendamises peituvad saagikuse tõstmise reservid, eriti „Kauka” kohta. Ülesanne seisab selles, et sordiomadusi ja kasvutingimusi arvestades kindlaks teha külvinormid, mis kindlustaksid kõige suuremad saigid.

Mineraalväetiste mõju taimede arenemisele ja saagistruktuuri kujunemisele

Sortide produktiivsusomaduste avaldumine oleneb suurel määral taimede toitumise tingimustest. Toiteelementide mõju suviniisusortide arenemisele ja saagistruktuuri kujunemisele uuriti põld- ja vegetatsioonikatsetes. Põldkatsed rajati järgmistes variantides (kg toimeainet hektarile):

1. P_2O_5 — 60,	K_2O — 45,	N — 60
2. P_2O_5 — 120,	K_2O — 45,	N — 60
3. P_2O_5 — 60,	K_2O — 45,	N — 120
4. P_2O_5 — 120,	K_2O — 45,	N — 120
5. Kontroll (väetiseta).		

Vegetatsioonikatses rajati sama skeemi järgi; katsenõudesse, mis olid täidetud 4 kg mullaga, anti mineraalväetisi: 1,0 või 2,0 g superfosfaati, 0,4 g kaalisoola ja 0,6 või 1,2 g ammoniumsulfaati.

Katseks võeti kolm sorti: „Diamant”, „Kauka” ja „Jõgeva 01926”.

Kasvukuhiku diferentseerumist ja pea algme arenemise käiku katse erinevates variantides jälgiti binokulaarse mikroskoobi abil. Vaatlused näitasid, et väetamata foonil toimus nii taimede kasv kui ka pea kujunemine aeglaselt. Esimeses katse variandis oli taimede kasv ja pea algme diferentseerumine väetamata fooniga võrreldes intensiivsem. Kahekordne fosforikogus (teine variant) kiirendas pea kujunemist, kuna lämmastiku ülekaal toitekeskkonnas (kolmas variant) pikendas pea kujunemise perioodi. Tugeval toitmisel fosfori ja lämmastikuga (neljas variant) toimus kasv eriti intensiivselt pea kujunemise suhteliselt kiire tempo juures.

Katse kõigis variantides teostati saagistruktuuri detailne analüüs. Saadud andmetest nähtub, et taimede toitumise parandamine avaldab tugevat positiivset mõju kõigi saagielementide kujunemisele: suureneb taimede kõrgus, pea pikkus, pähekute arv peas, õite ja terade arv pähikus, eriti aga terade kaal.

Saagielementide väljaarenemise intensiivsus erinevates katsevariantides kõigub suurtes piirides, olenevalt väetamisest ja sordi omadustest. „Kauka” ja „Jõgeva 01926” kasutavad suuremaid väetise annuseid paremini kui

„Diamant”. „Diamandi” pea madalam produktiivsus on tingitud peamiselt väiksemast 1000 tera kaalust.

Saagistruktuuri kujunemise uurimine seoses sortide kasvu- ja arenemisprotsesside jälgimisega erinevates toitumistingimustes võimaldab õigesti mõista ja selgitada taimede toitevajadusi ning välja töötada taimede toitumise ratsionaalset süsteemi.

Toiteelementide andmise aja mõju saagistruktuuri kujunemisele

Üheks taimede suunava mõjutamise ja väetiste ratsionaalse kasutamise võtteks on täiendav väetamine, s. o. toiteainete andmine vegetatsiooniperioodil taimede kasvu eri faasides ja erinevates arenemisstaadiumides.

Taimedele eri arenemisperioodidel lämmastikväetise täiendava andmise mõju selgitamiseks suviniisortide „Diamant”, „Kauka” ja „Jõgeva 01926” saagistruktuuri kujunemisele rajati vegetatsioonikatse.

Katse teostati nõudes, mis sisaldasid 4 kg mulda. Ühes katsevariandis (kontrollvariant) anti väetised (1,0 g superfosfaati, 0,4 g kaalisoola ja 0,6 g ammooniumsulfaati nõu kohta) enne külvi. Teistes katsevariantides anti lisaks enne külvi antud väetisele pealtväetisena lämmastikku (0,6 g ammooniumsulfaati nõu kohta) kas teise lehe faasis, neljanda lehe faasis, kõrdumisel või loomisel.

Lämmastiku täiendavast andmisest tingitud intensiivsem kasv ja pea algme aeglasem arenemine põhjustasid taimede produktiivsuse tõusu. Teise lehe faasis antud lämmastiku mõjul suurenesid kõik saagielemendid. „Diamant” ja „Jõgeva 01926” saavutasid antud variandis pea kõige suurema produktiivsuse. „Kauka” produktiivsus tõusis veel lämmastiku andmisel neljanda lehe faasis ja kõrdumisel.

Tuleb märkida erinevusi pea elementide kujunemises seoses lämmastiku andmise ajaga. Pähikute arv peas suurenes kõikidel sortidel lämmastiku andmisel teise lehe faasis. Hilisematel perioodidel antud lämmastik-pealtväetis ei tõstnud põhiliselt pähikute arvu peas, sest pea algme diferentseerumine pähikuteks oli selleks ajaks lõppemisel või juba lõppenud. Pähikute moodustamisejärgsel perioodil antud lämmastikväetis tõstis kontrollvariandiga võrreldes tunduvalt õite ja terade arvu, samuti ka 1000 tera kaalu.

„Kauka” kõrgem produktiivsus lämmastiku andmisel hilisematel perioodidel võib nähtavasti olla seletatav asjaoluga, et täiendavat väetamist teostati üldiselt kõrgel väetisfoonil, mistõttu taimede kasvu algperioodil ei olnud lisaväetis veel vajalik. See võib olla seotud ka „Kauka” bioloogiliste iseärasustega. Seega võib lämmastiku hilisem andmine kindlustada kõrge saagi ainult kõrgel väetisfoonil ja seda peamiselt õitsemise produktiivsuse tõusu arvel.

Teises katses uuriti üksikute toiteainete mõju saagistruktuuri kujunemisele nende andmisel enne külvi ja valgusstaadiumi algul. Katseandmed kinnitavad, et mineraalväetiste andmine vegetatsiooniperioodil ei anna külvi-eelse väetamisega võrreldes paremaid tulemusi, kui taimedel ei ole nende arenemise varasel perioodil vajalikul hulgal toiteaineid. Väetiste andmisel ainult vegetatsiooniperioodil jääb saak väiksemaks kui külvi-eelse andmisel.

Kui arvestada seda, et taimede nõudmine toiteainete suhtes on kõige suurem valgusestaadiumis, on selge, miks hilisema väetiste andmisega saadakse väiksem efekt. Praktikas tuleb seda arvestada ja mitte hilineda kevaldel väetiste andmisega.

Saagielementide kujunemine olenevalt veerežiimist taimede arenemise eri perioodidel

Veerežiimi mõju suvinisu saagielementide kujunemisele uuriti vegetatsioonikatsetes.

Katsevariandid:

- I — veepuudus pärast teise lehe ilmumist
- II — veepuudus pärast neljanda lehe ilmumist
- III — veepuudus kõrdumisel
- IV — veepuudus loomisel
- V — küllaldane mullaniiskus kogu vegetatsiooniperioodil (kontroll).



Joon. 4. „Diamandi” pea algme seisund 36. päeval pärast tärkamist. Vasakul — kasvanud optimaalse veerežiimi tingimustes. Paremalt — kasvanud põuatingimustes (veepuudus teise kuni neljanda lehe faasis, s. o. 11.—23. päeval pärast tärkamist). Pea kujunemine on toimunud kiiremini, kasv on jäänud maha arenemisest, mille tõttu pähekute arv peas on väiksem.

Veepuudus mullas loodi kastmise katkestamisega 12 päevaks. Enne ja pärast „põuaperioodi” hoiti katsealused taimed samades veerežiimi tingimustes nagu kontrolltaimed. Katse teostati niiskusenõudliku sordiga „Diamant”.

Saagistruktuuri analüüsi andmed näitavad, et pähekute arv pea kohta langeb kõige rohkem veepuudusel pärast teise lehe ilmumist, millal algab pähekute moodustumine (joon. 4). Põud pärast neljanda lehe ilmumist, kui pähekute algmed on juba põhiliselt kujunenud, avaldab negatiivset mõju õite ja terade kujunemisele. Põuatingimused järgnevatel arenemisfaasides põhjustavad terade arvu ja 1000 tera kaalu tunduvalt langemist.

Saadud andmed kinnitavad, et saagielementide väljaarenemise intensiivsus on otseses seoses veerežiimi tingimustega nende arenemise perioodidel. Põuatingimused avaldavad kõige suuremat pidurdavat mõju selle saagielementi väljaarendamisele, mille kujunemise perioodil taimi põuaga mõjutatakse.

Päeva pikkuse mõju suviniisusortide arenemisele ja pea algme kujunemisele

On teada, et sordid reageerivad päeva pikkuse muutumisele erinevalt. Et selgitada „Diamandi”, „Kauka” ja „Jõgeva 01926” reageerimist päeva pikkusele, rajati katsed põllutingimustes väikestel lappidel. Katsevariandid:

I — loomulik päeva pikkus (kontroll)

II — päeva pikkus 14 tundi

III — päeva pikkus 12 tundi.

Kontrollvariandi taimede valgusestaadiumi läbimine toimus juuni esimesel poolel ca 18-tunnise päeva pikkuse tingimustes. Valgustuse kestust II ja III katsevariandis reguleeriti taimede katmisega tõrvapapiga ülelõõdud vineerkastidega.

Katses uuriti pea algme arenemist ja kasvu dünaamikat olenevalt päeva pikkusest.



Joon. 5. „Diamandi” pea 43. päeval pärast tärkamist: vasakul 12-tunnise, keskel 14-tunnise päeva pikkuse tingimustes ja paremal loomuliku päeva pikkuse juures.

Taimede kasvu ja arenemise algperioodil — esimesel kahel nädalal pärast tärkamist — ei esinenud katsevariantide piires märgatavaid erinevusi kasvukuhiku arenemises. Viieteistkümnendal päeval pärast tärkamist võis juba kõikide sortide juures märgata erinevusi kasvukuhiku diferentseerumises olenevalt päeva pikkusest. Loomuliku päeva pikkuse tingimustes oli kasvukuhiku väljaulatumine ja diferentseerumine mõnevõrra intensiivsem lühendatud päeva, eriti 12-tunnise päeva tingimustega võrreldes.

Edasises arenemises ilmnisid sortide piires olulised erinevused. „Diamandi” pea algme arenemine oli lühikese päeva tingimustes rohkem pidurdatud kui „Kauka” ja „Jõgeva 01926-1”.

Teiste sortidega võrreldes reageeris lühikese päeva tingimustele kõige rohkem „Diamandi”. „Diamandi” loomine algas 14-tunnise päeva pikkuse puhul 29 päeva võrra hiljem kui loomuliku päeva tingimustes (joon. 5). „Kauka” loomine hilines 21 päeva ja „Jõgeva 01926” oma 19 päeva võrra.

Suhteliselt aeglasem arenemine lühema päeva tingimustes soodustas pea elementide kujunemist. 14-tunnise päeva pikkuse juures omasid taimed keskmiselt 3—5 pähikut pea kohta rohkem kui loomuliku päeva puhul. 12-tunnise päeva pikkuse puhul kestis pähikute diferentseerumise periood veel kauem ning pähikute arv peas suurenes, kuid taimed ei loonud kuni hilisügiseni.

Taimede kasvu ja arenemise tempo reguleerimine võimaldab tõsta pea produktiivsust ning suurendada pähikute ja terade arvu peas. Päeva pikkuse mõju saagistruktuuri kujunemisele vajab üksikasjalisemat uurimist seoses erinevate külviaegade ja teiste agrotehniliste võtete rakendamisega. See uurimine võib anda väärtuslikke juhiseid nii agrotehnikale kui ka sordiaretusele.

Järeldused

1. Võitluses suurte nisusaakide eest on Eesti NSV-s kasutada palju reserve. Saagi kujunemise uurimine akad. T. D. Lössenko poolt välja töötatud taimede stadiaalse arenemise teooria alusel näitab meile kätte tee taimede produktiivsuse tõstmiseks ja suurte saakide saamiseks kasvu ning arenemisprotsesside teadliku suunamise teel. Teostatud uurimised suviniisu saagi kujunemise alal Eesti NSV-s näitavad, et saagistruktuuri elementide arenemine toimub erinevates väliskeskkonna tingimustes väga erinevalt. Olulist osa etendavad ka sortide bioloogilised omadused.

2. Paljude saagi suurust määravate tegurite hulgas on tähtsaim väetamise intensiivsus. Kõrgemal agrofoonil, hea toite- ja veerežiimi tingimustes tõuseb suviniisu saak järsult kõigi saagielementide suurenemise tulemusena. Suureneb produktiivsete kõrte arv pinnaühikul, kasvab pähikute arv peas, terade arv pähikus ja 1000 tera kaal. Produktiivsete kõrte arvu suurendamine pinnaühikul on tingitud suuremast tärkavusest kõrgemal foonil, taimede väiksemast väljalangemisest vegetatsiooniperioodi kestel ja taimede rohkemast võrsumisest.

3. Tähtis on toiteainete õigeaegne andmine. Katsed näitasid, et taimed vajavad kõiki toiteaineid juba varasel arenemisperioodil. Kui enne külvi väetisi ei antud, vaid neid anti alles valgusestaadiumi algul (pärast teise lehe ilmumist), siis vähenes pähikute ja terade arv peas, langes 1000 tera kaal ja kogusaak.

Lämmastiku kasutamine pealtväetisena osutus kõige efektiivsemaks selle andmisel valgusestaadiumi algul, kuid lämmastiku hilisem täiendav andmine võib kõrgel väetisfoonil kindlustada saagi edasise tõusu õitsemise produktiivsuse ja terade arvu suurendamise tulemusena.

4. Heades kasvutingimustes ületavad Jõgeva Riiklikus Sordiaretusjaamas aretatud perspektiivsed suviniisusordid Eesti NSV-s rajoonitud sorti „Diamant”. Jõgeva sortide saagistruktuuri iseloomustab „Diamandiga” võrreldes suurem produktiivsete kõrte arv pinnaühiku kohta ja pea suurem produktiivsus. Madala mullaviljakuse tingimustes nende sortide enamsaak väheneb.

Parimaid tulemusi andis „Jõgeva 01926”, mille terasaak oli 1951. aastal 45,4 ts/ha. Ta omab suurt tera, palju teri peas ja annab tiheda kõrteseisu pinnaühiku kohta.

5. Eesti NSV tingimustes omab saagielementide kujundamisel ja seega saakide tõstmisel erilist tähtsust külviaeg. Varase külvi korral tõuseb suviniisu saak tunduvalt. See on seletatav sellega, et varase külvi korral satuvad taimede kasv ja arenemine ning valgusestaadiumi läbimine niisugustesse tingimustesse, mis kindlustavad nii kõrte kasvutiheduse kui ka pea produktiivsuse tõusu hilisemate külvidega võrreldes.

6. Taimede seisutiheduse reguleerimine külvinormi muutmisega avaldab saagile suurt mõju. Külvinormi suurendamisega saak esialgu tõuseb, kuid edasisel külvinormi suurendamisel hakkab uuesti langema pea produktiivsuse tunduva vähenemise tõttu. Sordid reageerivad külvinormi suurendamisele erinevalt. Seepärast on vajalik iga sordi jaoks välja selgitada optimaalne külvinorm, mis võimaldab tootmistingimustes erinevatel agrofooni-

del maksimaalsete saakide kasvatamist. Oige külvinormi kasutamine on üks tähtsamaid saagikuse tõstmise reserve.

7. Üks olulisi tegureid, millest oleneb saagielementide kujunemine, on päeva pikkus. Lühendatud päeva tingimustes aeglustub nisutaimede arenemine ning suureneb pähikute arv peas võrreldes taimedega loomuliku valgustuse tingimustes. Olenevalt sortide bioloogiliste omaduste erinevustest, avaldab päeva pikkus sortidele erisugust mõju. „Diamant” on päeva pikkuse suhtes nõudlikum kui „Kauka” ja „Jõgeva 01926”.

8. Peale kasvutingimuste ja sortide pärilike omaduste avaldab saagi kujunemisele suurt mõju ka taimede elujõulisuse aste. Sortidevahelisest ristamisest vaba tuultollemise teel saadud hübriidid on emasortidega võrreldes elujõulisemad ja omavad väärtuslikumaid majanduslikke tunnuseid. „Diamandi” ja „Kauka” hübriidseemne saagistruktuuri iseloomustas emasortide saagistruktuuriga võrreldes paremast tärkavusest tingitud suurem taimede seisutihedus, suurem terade arv peas ja suurem 1000 tera kaal.

9. Suvinisusaakide tõstmise reservide igakülgeks ärakasutamiseks on vajalik jätkata uurimisi saagikuse tõstmise bioloogiliste aluste selgitamiseks ning nende uurimiste alusel täiendada suurte saakide kasvatamise agrotehnikat vastavalt ühe või teise sordi bioloogilistele iseärasustele. Arvestades sortide bioloogilisi erinevusi, peab suurte saakide agrotehnikat täiendama sordiagrotehnikaga.

*Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Taimekasvatuse Instituut*

Saabus toimetusse
12. III 1954

KIRJANDUS

1. G. Malenkov, Aruandekõne UK(b)P Keskkomitee tööst Partei XIX kongressile, Tallinn, 1952, lk. 45.
2. T. D. Lõssenko, Agrobioloogia, Tartu, 1949, lk. 39.
3. С. Д. Гребенников, Анализ урожая и элементов урожайности пшеницы Цезиум 0111, Труды Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова, Том III (XVI), Омск, 1938, стр. 99.
4. В. Т. Еременко, О промежуточном периоде развития и анатомо-морфологических признаках световой стадии у пшеницы, Доклады АН СССР, т. XVIII, № 8, 1938.
5. Г. В. Заблуда, О фазах формирования генеративных органов у пшеницы, Доклады АН СССР, т. XXIII, № 4, 1939.
6. Л. С. Лукьянов, Динамика формирования колоса яровой пшеницы Мелянопус 069 в связи с прохождением стадий развития, Научные записки Украинского научно-исследовательского института соц. земледелия, т. I, вып. 2, 1940, стр. 90.
7. Н. С. Петин и Г. А. Зак, Влияние минеральных удобрений на формирование зачаточного колоса и урожай яровой пшеницы, Доклады ВАСХНИЛ, вып. 8, 1940, стр. 21.
8. В. Е. Писарев, Селекция на урожайность, Соц. реконструкция сельского хозяйства, № 9—10, 1937.
9. М. С. Савицкий, Биологические и агротехнические факторы высоких урожаев зерновых культур, Москва, 1948.
10. А. А. Сапегин, Ход развития колоса пшеницы, Доклады АН СССР, т. XVIII, № 3, 1938.
11. Н. А. Успенский, Продуктивность сортов яровой пшеницы и метод подбора их для скрещивания по интенсивности прохождения отдельных периодов развития, Записки Воронежского сельскохозяйственного института, т. XXI, вып. I, Воронеж, 1947.
12. А. К. Федоров, К вопросу о дифференциации конуса нарастания в связи со стадийным развитием растений, «Агробология», № 1, 1953.

СТРУКТУРА УРОЖАЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОРТОВ И УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ

О. Я. ПРИИЛИНН,

кандидат сельскохозяйственных наук

Резюме

Успешное выполнение поставленных партией и правительством задач по повышению урожайности сельскохозяйственных культур, в частности по увеличению производства пшеницы, требует знания биологических основ управления урожаем.

Задачей наших исследований было на основе изучения биологических особенностей сортов яровой пшеницы научно обосновать пути разработки сортовой агротехники для дальнейшего повышения урожайности этой культуры в Эстонской ССР. В опытах было изучено формирование элементов урожая сортов яровой пшеницы в различных условиях роста и развития на основе теории стадийного развития растений.

Исследования показывают, что в борьбе за высокие урожаи в нашем распоряжении имеются большие резервы. Разработанная акад. Т. Д. Лысенко теория стадийного развития растений указывает на возможность повышения продуктивности растений путем сознательного направления процессов роста и развития.

Формирование определяющих урожай элементов — число продуктивных стеблей на единицу площади, число колосков в колосе, число зерен в колоске и вес 1000 зерен — при разных внешних условиях происходит весьма различно. Существенное значение при этом имеют биологические особенности сортов.

Сравнительное изучение сортов на различных фонах показало, что на высоком агрофоне при хорошей обеспеченности питательными веществами и достаточной влажности почвы урожай яровой пшеницы резко повышаются благодаря хорошему развитию всех элементов урожая. Возрастание числа продуктивных стеблей при этом обуславливается более высокой полевой всхожестью, уменьшением выпадения растений в вегетационном периоде и более интенсивным кушением.

Для получения высокого урожая очень важным является своевременное внесение питательных веществ. Опыты показали, что опоздание с внесением в почву питательных веществ обуславливает ухудшение структуры урожая и уменьшение его. Если фосфорное, калийное и отчасти азотное удобрения перед посевом не были внесены, а вносились по всходам в фазе второго листа, то это приводило к снижению числа колосков и зерен в колосе и к уменьшению веса 1000 зерен по сравнению с теми вариантами опытов, в которых удобрения были внесены до посева.

Применение азота в подкормках оказалось наиболее эффективным в начале прохождения световой стадии. Более поздние подкормки азотом могут обеспечить дальнейшее повышение урожая за счет лучшего завязывания семян при цветении и увеличения вследствие этого числа зерен в колосках, но это повышение имеет место лишь в том случае, если растения получили обильное питание в самом раннем периоде жизни.

Сорта Йыгеваской государственной селекционной станции, выведенные на высоком агрофоне, при обильном удобрении значительно превосходят по урожайности районированный в Эстонской ССР сорт Диамант, благодаря тому, что они в этих условиях образуют большее число продуктивных стеблей на единицу площади и более продуктивный колос, чем

Диамант. В условиях низкого плодородия почвы различия в урожайности их, по сравнению с урожаем сорта Диамант, уменьшаются. Наиболее урожайным является перспективный сорт яровой пшеницы Йыгева 01926, урожай которого в 1951 году в опытах составил 45,4 ц с га. Йыгева 01926 имеет крупное зерно, много зерен в колосе и отличается густым стеблестоем (табл. 1).

Проведенными ранее в Институте растениеводства Академии наук Эстонской ССР исследованиями (Э. Халлер) доказано, что одним из важнейших условий для получения высоких урожаев яровой пшеницы в Эстонской ССР является правильный выбор срока посева. При раннем посеве урожай значительно повышается. Наши исследования показывают, что различия в условиях, которые создаются разными сроками посева, вызывают существенные различия в росте, процессах развития и формировании элементов урожая. При раннем посеве прохождение стадии яровизации и световой стадии, в сравнении с поздними сроками посева, совпадает с более благоприятными условиями для получения густого стеблестоя и формирования продуктивного колоса: развитие и рост проходит при более низкой температуре, более благоприятных водном режиме и длине дня. С запозданием посева, вследствие пересыхания верхних слоев почвы значительно понижались полевая всхожесть семян и кущение растений. Одновременно увеличивалось число непродуктивных стеблей на единицу площади. При позднем посеве урожай зерна у сорта Йыгева 01926 понизился больше, чем у сортов Диамант и Каука.

В зависимости от агробиологических особенностей сортов и от условий выращивания необходимо для обеспечения высоких урожаев вместе с другими агротехническими приемами дифференцировать и нормы высева. Исследования показывают, что соответствующая каждому сорту оптимальная норма высева обеспечивает более полное использование особенностей сорта для повышения урожайности и является одним из важных звеньев в комплексе сортовой агротехники.

При увеличении густоты стеблестоя до известного оптимума урожай зерна с единицы площади повышается, несмотря на одновременное понижение продуктивности колоса.

Чрезмерное увеличение нормы высева приводит к уменьшению урожая вследствие значительного снижения продуктивности колоса. Продуктивность колоса Каука по сравнению с Диамантом и Йыгева 01926 при увеличении посевной нормы (до 800 всхожих семян на 1 кв. м) понизилась меньше. Результаты наших опытов и производственный опыт указывают на необходимость выяснить резервы повышения урожайности отдельных сортов путем увеличения нормы высева, в частности сорта Каука.

В вегетационных опытах было изучено формирование элементов урожая в зависимости от водного режима в отдельные периоды развития растений. Исследования подтвердили тот факт, что условия засухи оказывают наибольшее влияние на тот элемент урожая, в период формирования которого засуха оказывает воздействие на растение. При недостатке воды после появления второго листа, когда начинается образование колосков, сильнее снизилось число колосков в колосе. Засуха после появления четвертого листа, когда зачатки колосков уже в значительной степени сформировались, оказала отрицательное влияние на формирование цветков и зерен. Засуха в последующих периодах развития оказала значительное влияние на снижение числа зерен в колосе и веса 1000 зерен.

Различие биологических особенностей сортов проявляется и в различном их отношении к длине дня. Длина дня является важным фактором, от которого также зависит формирование элементов урожая. При прохождении световой стадии в условиях 14-часового дня развитие протее-

кало медленно и увеличивалось число колосков в колосе по сравнению с вариантом в условиях естественного дня. Диамант сильнее реагировал на сокращение длины дня, чем Каука и Йыгева 01926. Колошение у Диаманта при 14-часовом дне наступило на 29 дней позднее, чем в условиях естественного дня. Колошение у Каука при 14-часовом дне запоздало на 21 день, а у Йыгева 01926 на 19 дней. В условиях 12-часового дня период дифференциации колосков растянулся еще больше и число колосков в колосе еще повысилось, но при этом растения всех сортов не выколосились до поздней осени.

Кроме внешних условий и биологических особенностей сортов, на урожайность оказывает большое влияние степень жизненности растений. Полученные при свободном межсортовом переопылении гибриды сортов Диамант и Каука обладали более высокой жизненностью по сравнению с материнскими сортами. В результате повышенной жизненности эти гибриды имели более высокую полевую всхожесть, обеспечивающую более густое стояние растений, а также отличались большим числом зерен в колосе и большим весом 1000 зерен по сравнению с материнскими сортами. Это преимущество межсортовых гибридов по урожайности в большей степени проявляется на высоком агрофоне.

Для всестороннего использования резервов повышения урожайности яровой пшеницы необходимо продолжать углубленное изучение биологических особенностей сортов и, исходя из этих особенностей, применительно к каждому сорту разработать агротехнику высоких урожаев.

*Институт растениеводства
Академии наук Эстонской ССР*

Поступила в редакцию
12 III 1954