

Напротив, октан активно участвует в процессе фотоокисления, который, по-видимому, сенсибилизируется 3,4-бензпиреном [2]; значительная часть энергии ультрафиолетового излучения расходуется при этом на превращение растворителя, а не растворенного вещества. В случае же ацетона на разложение последнего, по-видимому, также расходуется известная доля подводимой энергии, но получаемые при этом продукты обладают высокой реакционной способностью и ускоряют процесс превращения бензпирена, содействуя повышению эффективности суммарного процесса фотолиза.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Паальме Л., Губергриц М., Изв. АН ЭССР, Хим. Геол., 16, № 1, 32 (1967).
2. Паальме Л., Губергриц М., Изв. АН ЭССР, Хим. Геол., 17, № 2, 99 (1968).
3. Аллен А. О., Радиационная химия воды и водных растворов. М., 1963.
4. Waxendale J. H., Bridge N. K., J. Phys. Chem., 59, No. 8, 787 (1955).
5. Parker C. A., Proc. Roy. Soc., A 220, 104 (1953).

Институт химии  
Академии наук Эстонской ССР

Поступила в редакцию  
21/VI 1968

EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. XVII KOIDE  
KEEMIA \* GEOLOOGIA. 1968, Nr. 4

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ XVII  
ХИМИЯ \* ГЕОЛОГИЯ. 1968, № 4

К. ЛЭАТС, А. ЭРМ, Э. ЛИППМАА, Ю. ПУСКАР

### О СОСТАВЕ ПРОДУКТА РЕАКЦИИ ТЕЛОМЕРИЗАЦИИ ИЗОПРЕНА С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ

K. LAATS, A. ERM, E. LIPPMAA, J. PUSKAR. ISOPREENI JA AADIKHAPPE TELOMERISATSIONIPRODUKTI KOOSTISEST

K. LAATS, A. ERM, E. LIPPMAA, J. PUSKAR. ON THE COMPOSITION OF THE ISOPRENE AND ACETIC ACID TELOMERIZATION PRODUCT

Исследовались спектры ядерного магнитного двойного резонанса (ЯМДР) высокого разрешения препаративно выделенных фракций монотерпеновых оксипроизводных (пики 8, 9 и 17 на хроматограмме, приведенной в [1]) в виде 20%-ного раствора в четыреххлористом углероде с прибавкой 1—3% тетраметилсилана в качестве внутреннего стандарта. Спектры были сняты на универсальном спектрометре ЯМР [2] при комнатной температуре, на частоте 40 Мгц. Выяснилось, что данные фракции являются продуктами нерегулярного присоединения карбониевого иона к изопрену в положениях 3 и 4.

Вещество (пик 8): 2,7-диметиллоктадиен-1,6-ол-3, т. кип. 76—78° (5 мм рт. ст.),  $n_D^{20}$  1,4676,  $d_4^{20}$  0,8770, чистота не менее 95%, химические сдвиги протонов в миллионных долях и число протонов соответствующих групп:

