



Р. Баринским был определен состав лантаноидов в четырех химически выделенных осадках редких земель с точностью 5–7% и чувствительностью 0,05% (табл. 2). Иттрий при этом не определялся. Количественно преобладают лантаноиды цериевой группы, имеющие в основном цериевый максимум (табл. 2; рисунок, обр. 907). Это характерно также для распределения лантаноидов в земной коре (по В. Гольдшмидту, 1938) и в фосфоритах (по Е. Семенову, В. Холодову и Р. Баринскому, 1962). Только в одном случае (обр. 3) встречается неодимовый максимум.

Таблица 2
Содержание и состав лантаноидов в оболочках фосфоритах ($\Sigma \text{TR}_2\text{O}_3 = 100\%$)

№ образца	TR ₂ O ₃ , %	Состав редких земель, %													
		La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tu	Yb	Lu
907	0,16	13,7	37,9	5,2	16,3	5,9	0,7	9,8	0,7	4,6	—	1,9	—	2,6	0,7
17	0,14	12,7	35,9	5,1	16,5	14,4	0,3	5,8	0,5	3,4	0,3	2,1	0,5	2,1	0,4
3	0,07	2,0	3,1	16,3	75,8	1,9	0,3	0,5	—	0,1	—	—	—	—	—
4	0,06	15,1	39,8	5,4	15,7	5,4	0,6	7,8	1,2	3,6	0,6	1,8	(0,3)	3,0	(0,5)

Данные табл. 1 показывают, что между содержанием в породе P₂O₅ и суммой TR₂O₃ существует прямая зависимость. Следовательно, содержание редких земель, а также иттрия зависит от насыщенности пород фосфатами. Так как в песчаниках пакерортского горизонта фосфатный материал в основном представлен фосфатными створками оболид, то можно сказать, что редкие земли концентрируются в створках оболид. Они могут изоморфно входить в решетку фосфатного минерала (франколита), из которого сложены створки (Лоог, 19626).

Редкие земли, по всей вероятности, находились в воде раннегермадокского бассейна Прибалтики в состоянии резкого недосыщения. В организмах оболид они выполняли определенную физиологическую роль и могли впоследствии накапливаться в створках. Из этого следует, что концентрация редких земель в оболочках фосфоритах является в основном сингенетической. Но иногда относительное обогащение фосфатных створок оболид неодимом происходит в процессе диагенеза. По Е. Семенову и Р. Баринскому (1958), при окислительно-



Состав лантаноидов в оболочках фосфоритах: I — обр. 907; II — обр. 3.

восстановительных процессах в осадках церий может окисляться до четырехвалентного состояния. Так как четырехвалентный церий малопод-

вижен и трудно растворим, то в иловых растворах наблюдается нарушение нормального спектра редких земель. Таким образом и в створках оболид могла появляться ассоциация лантаноидов с неодимовым максимумом (рисунок, обр. 3).

ЛИТЕРАТУРА

- Виноградов А. П. 1962. Среднее содержание химических элементов в главных типах изверженных горных пород земной коры. Геохимия, № 7.
- Гольдшмидт В. М. 1938. Принципы распространения химических элементов в минералах и горных породах. Сборник статей по геохимии редких элементов. М.—Л.
- Краускопф К. Б. 1959. Осадочные месторождения редких металлов. В сб.: Проблемы рудных месторождений. М.
- Лоог А. Р. 1962а. К геохимии нижнего ордовика Эстонии. Тр. Ин-та геол. АН ЭССР, 10.
- Лоог А. Р. 1962б. О фосфатном материале оболых фосфоритов. Изв. АН ЭССР, Сер. физ.-матем. и техн. наук, II, № 3.
- Семенов Е. И., Баринский Р. Л. 1958. Особенности состава редких земель в минералах. Геохимия, № 4.
- Семенов Е. И., Холодов В. Н., Баринский Р. Л. 1962. Редкие земли в фосфоритах. Геохимия, № 5.

Тартуский государственный
университет

Поступила в редакцию
5/V 1968