

Элсбет ЛИЙВРАНД

К МЕТОДИКЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТЛОЖЕНИЙ МЕЖЛЕДНИКОВЫХ И ЛЕДНИКОВЫХ ЭПОХ НА ПРИМЕРЕ РАЗРЕЗА КОНЕВИЧА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Палинологический метод — один из наиболее широко применяемых в стратиграфии и палеогеографии. Исследованию подвергаются отложения различных генетических типов как межледниковых, так и ледниковых времен. Но при этом не всегда учитываются существенные различия в формировании спорово-пыльцевых спектров таких разных палеогеографических эпох. Если во время межледниковий, в том числе в голоцене, пыльца и споры в отложениях практически всегда непосредственно отражают состав окружающей растительности, то присутствующий в отложениях ледниковых эпох «чужой» компонент в виде переотложенных пыльцы и спор искажает спектры и мешает восстановлению палеорастительностей и климатов. Пренебрежение фактом переотложения приводит к неправильной оценке ранга стратиграфических подразделений, к неправильной корреляции отложений и к неверным палеогеографическим выводам.

Методическая основа интерпретации таких смешанных спектров разработана в лаборатории спорово-пыльцевого анализа Института географии АН СССР (Гричук и др., 1969). Для разделения разновозрастных компонентов (инситной и переотложенной частей спектров) используется эколого-географический анализ определенных видов растений. Но в практике такой метод, к сожалению, не всегда заслуживает должного внимания. Возможно, это обусловлено еще отсутствием полного представления о масштабах переотложения во время оледенений, а также отсутствием полной осознанности ошибок, связанных с переотложением пыльцы и спор.

Наиболее полное представление о масштабах переотложения можно получить по таким опорным разрезам, которые охватывают отложения как межледниковой, так и ледниковой эпох. Такими являются верхнеплейстоценовые разрезы местностей Пасья и Колешки на р. Ваге в Архангельской области (Лийвранд, 1981), разрезы Суур-Прангли и Вяэна-Йыэсуу (Раукас, Лийвранд, 1971 и др.). Относительно широкому временному диапазону позднего плейстоцена соответствуют и отложения в разрезе Коневича, подвергавшиеся местами сильному переотложению (рис. 1).

Разрез Коневича, предложенный нам для изучения Л. Н. Вознячком, находится на 100 м выше устья ручейка Коневича, впадающего в Западную Двину у г. Велижа. Самые низы разреза представлены песком и озерной известью позднеледниковья московского оледенения (зона M_1 *). Буровато-серый мелкозернистый песок содержит очень

* Пыльцевая зона M_1 ранее считалась началом микулинского межледниковья (Гричук, 1961). Позже, вследствие уточнения критерия разграничения ледниковых и межледниковых флор, эти отложения были отнесены к позднеледниковью среднеледниковья московского оледенения (Гричук и др., 1969).

много переотложенных дочетвертичных палиноморф — 600% сверх суммы четвертичных пыльцы и спор (рис. 2). Представлены они преимущественно карбоновыми спорами (Кедо, 1966), но встречаются некоторые мезозойские и девонские. Карбоновые породы, выходы которых в настоящее время сохранились в московской синеклизе и в западной части Восточно-Европейской платформы, имели ранее, по всей вероятности, гораздо большее распространение. Эродирование богатых спорами карбоновых пород ледниками и их талыми водами обогатило морены и водноледниковые отложения этими спорами. В слое голубовато-серой извести на глубине 18,40—18,67 м количество дочетвертичных палиноморф быстро уменьшается и преобладающими становятся четвертичные пыльца и споры. В их составе преобладают споры зеленых мхов (45—75%). Количество пыльцы трав уменьшается вверх по интервалу от 20 до 6%, а количество пыльцы древесных пород увеличивается в том же направлении от 5 до 10%. Пыльцы древесных пород в этом слое слишком много из-за наличия переотложенной пыльцы межледниковых термофильных пород, особенно на глубине 18,65 м. Характерно более высокое содержание переотложенной пыльцы ольхи (55%), чем пыльцы лещины (14%). Широколиственные породы представлены пылью вяза, липы и граба. Сходный состав переотложенной пыльцы в среднеплейстоценовых ледниковых отложениях обнаружен и в других опорных разрезах, что свидетельствует о переотложении их в основном из лихвинских межледниковых отложений (Лийвранд, 1982). Этот переотложенный комплекс пыльцы межледниковых термофильных пород зоны M_1 экологически несовместим с инситной частью спектров, несомненно перигляциальной растительности, которая вместе с пылью сосны и березы *Betula nana* L. представлена в основном лебедовыми (до 60%) с *Eurotia ceratoides* (L.) С. А. М. и в меньшей степени полынью (до 30%). Присутствуют *Helianthemum* sp. и *Selaginella selaginoides* (L.) Link.

Выше по разрезу, в слое желтовато-белой озерной извести (зона M_2) переотложенная пыльца убывает и преобладающей становится пыльца сосны (80—95%). Это говорит о распространении уже сомкнутых сосновых лесов в начале межледниковья. Типичная лесная растительность продуцирует в таком большом количестве инситной пыльцы, что переотложенные пылевые зерна становятся практически незаметными. В перигляциальных условиях, наоборот, продукция низкорослой травянистой и кустарниковой растительности пылинок столь скудна, что переотложенные палиноморфы часто становятся преобладающими. В начале формирования сапропелита в составе сосновых лесов появляются береза, дуб, вяз и лещина (зона M_3).

Первая половина климатического оптимума микулинского межледниковья представлена максимально дубом (30—70%) и вязом (10—15%) со значительным участием лещины (зона M_4). Однако верхняя часть этой зоны уже затронута влиянием валдайского оледенения. Это прослеживается как по разрушениям и песчаным прослойкам в толще верхней части сапропелита, так и по искажениям закономерностей спорово-пылевых спектров. Пыльца и споры в песчаной прослойке на глубине 17,50 м явно происходят из эродированных отложений. Состав их отличается от состава зоны M_4 .

Выше по разрезу разрушение межледниковых отложений все заметнее. В интервале 16,60—17,20 м прослеживается неравномерное переслаивание сапропелита, разнотекстурного песка с гравием и галькой и серых алевроитов с прослоями невыдержанных гумусированных песков. Прослеживаются криотурбационные явления, кровля неровная, сильно окрашена гидроокисями железа. Спорово-пылевые спектры свидетельствуют о переотложениях верхней части микулинских межледнико-

вых отложений, богатых пылью ольхи и лещины. Но в их составе быстро увеличивается участие пыльцы карликовых берез (до 70%) и трав (до 45%) как признак распространения валдайской перигляциальной растительности.

Верхняя часть изученного разреза характеризуется типичными смешанными спорово-пыльцевыми спектрами, состоящими из инситной части пыльцы перигляциальной растительности, а также из пыльцы и спор, переотложенных из микулинских межледниковых слоев. Участие последних так велико, что они существенно мешают прослеживанию состава перигляциальной растительности. Только интервал 15,7—16,0 м отличается высоким содержанием пыльцы трав: 60—90%. По традиционной интерпретации спорово-пыльцевых спектров такое явление обычно рассматривается как признак похолодания. Но в действительности может быть и наоборот. В этом интервале существенно уменьшается количество переотложенной пыльцы широколиственных пород, ольхи и лещины (до 5% каждой). В остальных случаях количество переотложенной пыльцы ольхи 5—15, лещины 10—35, широколиственных пород 5—18%. Кроме того, переотложена и часть пыльцы межледниковых бореальных пород — сосны и древовидных берез, которую уже невозможно более точно отличить от пыльцы сосны и березы, растущих в ледниковое время. Мысленно исключая переотложенную пыльцу термофильных и части бореальных пород из общего состава спорово-пыльцевых спектров верхней части разреза, можно убедиться, что количество пыльцы трав заметно увеличивается, достигая таких же или, может быть, еще больших величин, чем в интервале 15,70—16,00 м. Уменьшение количества переотложенной пыльцы в названном интервале связано с уменьшением привноса продуктов переотложения в озерный бассейн, а также с кратковременным торфообразованием. Получена радиоуглеродная датировка этого слоя: $34\,800 \pm 1300$: TIp-424 (Раямзя, 1982). Этот слой, соответствующий, по всей вероятности, потеплению, белорусские исследователи относят к шапуровскому межстадиалу (Санько, 1981).

Выше по разрезу, на алевроитах с размывом залегают бурые пески с гравием, галькой и редкими валунами. Разрез завершается фиолетово-коричневой мореной (мощность 4,5 м), которую белорусские исследователи относят к максимальной стадии валдайского оледенения.

Результаты исследования данного разреза подтверждают факт различий формирования спорово-пыльцевых спектров ледниковых и межледниковых эпох. Если интерпретация и корреляция межледниковых спектров, состоящих из инситной пыльцы, не вызывает трудностей, то расшифровка спорово-пыльцевых спектров ледниковых эпох — сложная задача. Для этого совершенно необходимо разграничение инситной и переотложенной частей спектров, что в настоящее время наиболее эффективно проводится при помощи эколого-географического анализа. Пренебрежение фактом переотложения может привести к ошибочному выделению новых межстадиалов, новых климатических оптимумов межледниковий или даже новых межледниковий. Это, несомненно, мешает стратиграфической и палеогеографической реконструкциям плейстоцена.

ЛИТЕРАТУРА

- Гричук В. П. Ископаемые флоры как палеонтологическая основа стратиграфии четвертичных отложений. — В кн.: Рельеф и стратиграфия четвертичных отложений северо-запада Русской равнины. М., 1961, 25—71.
- Гричук В. П., Мальгина Е. А., Монозон М. Х. Значение палеоботанических мате-





Рис. 2. Дочетвертичные палиноморфы. 1—2 *Trematozonotriletes* sp. sp., 3 — *Trilobozonotriletes* sp., 4—5 *Euryzonotriletes* sp., 6—7 *Simozonotriletes* sp. sp.,



8 — *Dictyozonotriletes* sp., 9 — *Diatomozonotriletes* sp., 10 — *Perisaccus primigenius* Naum., 11 — *Zonotriletes* sp., 12 — *Archaeozonotriletes* sp., 13 — *Gleichenia* sp.

риалов для стратиграфии валдайских отложений. — В кн.: Последний ледниковый покров на северо-западе Европейской части СССР. М., 1969, 57—105.

Кедо Г. И. Споры нижнего карбона Припятского прогиба (яснопольянский подъярус). — В кн.: Палеонтология и стратиграфия БССР. Минск, 1966, 3—143.

Лийвранд Э. Д. О возрасте и корреляции слоев разрезов Пасьева и Колешки Архангельской области по геологическим и палинологическим данным. — В кн.: Геология плейстоцена северо-запада СССР. Апатиты, 1981, 72—86.

Лийвранд Э. Значение переотложенной пыльцы межледниковых термофильных древесных пород в стратиграфии. — Изв. АН ЭССР. Геол., 1982, 31, 75—79.

Раукас А., Лийвранд Э. Плейстоценовые отложения в разрезе Вяэна-Йыесуу (Северная Эстония) и их генезис. — Изв. АН ЭССР. Хим. Геол., 1971, 20, 60—72.

Раямяэ Р. А. Геохронология позднего плейстоцена северо-западной части Восточно-Европейской равнины по данным усовершенствованного радиоуглеродного метода. — Автореф. канд. дис. Таллин, 1982.

Санько А. Ф. Краткий очерк стратиграфии неоплейстоценовых отложений Северо-Восточной Белоруссии и смежных районов Смоленской области. — В кн.: Геологические исследования кайнозоя Белоруссии. Минск, 1981, 45—55.

Институт геологии
Академии наук Эстонской ССР

Поступила в редакцию
1/VI 1983

Elsbet LIIVRAND

JÄÄVAHEAEGADE JA JÄÄTUMISAEGADE SETETE PALUNOLOOGILISE UURIMISE METOODIKAST KONEVITSI LÄBILOIKE (SMOLENSKI OBLAST) NAITEL

Artiklis on näidatud õietolmuspektrite moodustumise iseärasusi jäävaheaeegade ja jäätumisaegade setetes ning rõhutatud vajadust eraldada ümbersettinud vormid välja jäätumisaegsetest setetest.

Elsbet LIIVRAND

ON A METHOD OF PALYNOLOGICAL INVESTIGATIONS OF INTERGLACIAL AND GLACIAL DEPOSITS ON THE EXAMPLE OF THE KONEVICH SEQUENCE IN SMOLENSK REGION

The formation of pollen spectra during the Interglacials and Glacials differed substantially. Interglacial deposits contain practically primary pollen and spores only. The Late-Glacial deposits of the Middle Pleistocene in the Konevich Sequence (Fig. 1) contain a lot of rebedded pollen and spores from both the Pre-Quaternary rocks (Figs 2, 3) and the Likhvian Interglacial layers. Deposits of the Valdaian Glacial Stage are oversaturated with rebedded pollen from Mikulian layers. In interstadial deposits the content of rebedded pollen decreased. For drawing correct stratigraphical and paleogeographical conclusions it is absolutely necessary to separate the different-aged parts of pollen spectra. At present the most effective method for it is the ecological-geographical analysis of the investigated species.