

УДК 517.988

Р. ЛЕПП

# УСЛОВИЯ ДИСКРЕТНОЙ АППРОКСИМАЦИИ ПРОСТРАНСТВА СУЩЕСТВЕННО ОГРАНИЧЕННЫХ ФУНКЦИЙ

(Представил Г. Вайникко)

1. Постановка задачи. Пусть  $m$  — конечная регулярная борелевская мера с носителем  $S \subset R^t$ , определенная на сигма-алгебре  $\Sigma$  борелевских множеств из  $S$ . Рассмотрим пространство функций  $L^\infty(S, \Sigma, m)$ , состоящее из  $m$ -измеримых существенно ограниченных на  $S$  функций  $y(s)$  с нормой

$$\|y\| = \text{vraisup}_{s \in S} |y(s)|,$$

где  $|\cdot|$  — евклидова норма вектора.

При дискретной аппроксимации экстремальных задач и операторных уравнений возникает вопрос: какие условия гарантируют сходимость (см. [1])

$$\|p_n y\|_n \rightarrow \|y\|, \quad n \rightarrow \infty \quad \forall y \in L^\infty(m), \quad (1)$$

где  $p_n$  — кусочно-интегральный связывающий оператор между пространствами  $L^\infty(S, \Sigma, m)$  и пространством векторов  $b_n$  с топологией тах-нормы

$$\|y_n\|_n = \max_{1 \leq i \leq n} |y_{in}|, \quad y_n \in b_n$$

(требование (1) гарантирует единственность предела любой дискретно сходящейся последовательности элементов).

Пусть имеется сходящийся квадратурный процесс:

$$\sum_{i=1}^n h(s_{in}) m_{in} \rightarrow \int h(s) m(ds), \quad n \rightarrow \infty, \quad (2)$$

для любой непрерывной на  $S$  функции  $h(s)$ , где  $s_{in}$ ,  $i=1, \dots, n$ , некоторые точки из  $S$ .

Введем между пространствами  $L^\infty(m)$  и  $b_n$  связывающий их оператор  $p_n$  в следующем виде:

$$(p_n y)_{in} = m(A_{in})^{-1} \int_{A_{in}} y(s) m(ds), \quad i=1, \dots, n, \quad \forall y \in L^\infty(m), \quad (3)$$

где множества  $A_{in} \in \Sigma$ ,  $i=1, \dots, n$ , удовлетворяют следующим условиям:

- 1)  $m(A_{in}) > 0$ ; 2)  $\bigcup_{i=1}^n A_{in} = S$ ; 3)  $A_{in} \cap A_{jn} = \emptyset$ ,  $i \neq j$ ;
- 4)  $s_{in} \in A_{in}$ ; 5)  $\text{diam } A_{in} \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow \infty$ ;
- 6)  $\max_{1 \leq i \leq n} |m_{in} m(A_{in})^{-1} - 1| \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow \infty$ ;
- 7)  $m(A_{in}^0) = m(A_{in}) = m(\bar{A}_{in})$

(здесь  $\text{diam } A = \sup_{s, t \in A} |s - t|$ , а через  $A^0$  и  $\bar{A}$  обозначены соответственно внутренность и замыкание множества  $A$ ).

В следующем пункте приведем достаточные условия, гарантирующие сходимость (1) в пространстве существенно ограниченных функций.

2. Достаточные условия аппроксимации. Предположим, что мера  $m$  удовлетворяет ограничению A1):

$$A1) \quad m\{s \mid |s - s_0| = \text{const}\} = 0 \quad \forall s_0 \in S$$

(например, если  $m$  вероятностная мера с плотностью, то ограничение A1) выполнено).

Введем кроме нормы  $\|y\|$  элемента  $y$  из  $L^\infty$  еще и ее  $L^p$ -норму

$$\|y\|_p = \left( \int |y(s)|^p m(ds) \right)^{1/p}$$

и следующие нормы векторов:

$$\|p_n y\|_n = \max_{1 \leq i \leq n} |(p_n y)_{in}| = \max_{1 \leq i \leq n} |m(A_{in})^{-1} \int y(s) m(ds)|,$$

$$|p_n y|_{n,p} = \left( \sum_{i=1}^n |m(A_{in})^{-1} \int y(s) m(ds)|^p m_{in} \right)^{1/p}.$$

**Предложение.** Пусть имеется система связывающих операторов  $\{p_n\}$  в виде (3) со свойствами 1)–7). Пусть носитель  $S$  меры  $m$  ограниченное замкнутое множество и пусть выполнено условие A1). Тогда, если квадратурный процесс (2) сходится, то

$$\|p_n y\|_n \rightarrow \|y\|, \quad n \rightarrow \infty \quad \forall y \in L^\infty(m).$$

**Доказательство.** Идея доказательства заключается в следующем: исходим из известных сходимостей

1.  $\|y\|_p \rightarrow \|y\|, \quad p \rightarrow \infty \quad \forall y \in L^\infty(m)$   
(см., напр., [2], § 14.11) и

2.  $\|p_n y\|_{n,p} \rightarrow \|y\|_p, \quad n \rightarrow \infty \quad \forall p \in [1, \infty)$

(эта сходимость эквивалентна двум следующим условиям:

2а.  $\|p_n\|_n \leq \text{const},$

2б.  $\|p_n\|_{n,p} \rightarrow \|y\|_p$  для любого  $y$  из пространства непрерывных функций  $C(S)$ , где  $C(S)$  всюду плотно в  $L^p(m)$ ,  $1 \leq p < \infty$ ).

Для доказательства сходимости (1) исходим из неравенства

$$\begin{aligned} & |\|y\| - \|p_n y\|_n| \leq |\|y\| - \|y\|_p| + \\ & + |\|y\|_p - \|p_n y\|_{n,p}| + |\|p_n y\|_{n,p} - \|p_n y\|_n|. \end{aligned} \quad (4)$$

Для любого малого  $\varepsilon > 0$  можем выбирать

1. число  $\bar{p}_1$  такое, что при  $p_1 \geq \bar{p}_1$  имеем

$$|\|y\| - \|y\|_{p_1}| \leq \varepsilon/3,$$

2. индекс  $n_1 = n_1(p_1)$  такой, что при  $n_1$  имеем

$$|\|y\|_{p_1} - \|p_{n_1} y\|_{n_1, p_1}| \leq \varepsilon/3.$$

Рассмотрим третье слагаемое из суммы (4). Покажем, что существуют (независимые)  $p_2$  и  $n_2$  такие, что при  $p \geq p_2$ ,  $n \geq n_2$  имеем

$$|\|p_n y\|_{n,p} - \|p_n y\|_n| \leq \varepsilon/3 \quad \forall y \in L^\infty(S, \Sigma, m).$$

Для любого  $n = 1, 2, \dots$  и  $p \in [1, \infty)$  имеем

$$\left( \sum_{i=1}^n |(p_n y)_{in}|^p m_{in} \right)^{1/p} \leq \max_{1 \leq i \leq n} |(p_n y)_{in}| \left( \sum_{i=1}^n m_{in} \right)^{1/p}.$$

Так как при  $n \geq n_3$  имеем  $\left( \sum_{i=1}^n m_{in} \right)^{1/p} \leq C^{1/p} \rightarrow 1$  при  $p \rightarrow \infty$ , то при

$p_3 \in [1, \infty)$  имеем  $\left( \sum_{i=1}^n |(p_n y)_{in}|^{p_3} m_{in} \right)^{1/p_3} \leq \max_{1 \leq i \leq n} |(p_n y)_{in}| + \varepsilon/3.$



Докажем обратное неравенство. Объясним идею доказательства. Исходим из того, что для любого  $\varepsilon > 0$  существует множество  $D \in \Sigma$  с положительной мерой,  $m(D) > 0$ , такое, что  $|y(s)| \geq \|y\| - \varepsilon/6$ . Тогда и

$$|y(s)|^p \geq (\|y\| - \varepsilon/6)^p \quad \forall s \in D$$

для любого  $p \in [1, \infty)$ . Введя характеристическую функцию множества

$$\chi_D(s) = \begin{cases} 1, & \text{если } s \in D, \\ 0, & \text{если } s \notin D, \end{cases}$$

имеем теперь уже для любого  $s \in S$

$$\chi_D(s) |y(s)|^p \geq (\|y\| - \varepsilon/6)^p \chi_D(s) \quad \forall s \in S. \quad (5)$$

Функцию  $\psi(s) \stackrel{\Delta}{=} \chi_D(s) |y(s)|^p$  мы можем (как элемент пространства  $L^1(S, \Sigma, m)$ ) аппроксимировать непрерывной функцией вида

$\varphi(s) \stackrel{\Delta}{=} z(s) |y_c(s)|^p$ . Для последней в свою очередь можем использовать эквивалентную (см. [1], с. 14) системе  $\{p_n\}$  систему связывающих операторов  $\{p'_n\}$  в виде  $(p'_n \varphi)_{in} = \varphi(s_{in})$ , где  $s_{in}, i=1, \dots, n$ , точки из (2). Но  $(p'_n \varphi)_{in} = (p'_n z)_{in} (p'_n |y_c|^p)_{in}$ . А последнее дает нам возможность оценить разность

$$\left| \sum_{i=1}^n ((p_n \chi_D |y|^p)_{in} - (p'_n z)_{in} |p_n y_c|_{in}^p) m_{in} \right|$$

После этих вводных замечаний приступим к доказательству неравенства: существуют (независимые)  $p_4$  и  $n_4$  такие, что при  $p \geq p_4$  и  $n \geq n_4$  имеем

$$\left( \sum_{i=1}^n |p_n y|_{in}^p m_{in} \right)^{1/p} \geq \max_{1 \leq i \leq n} |p_n y|_{in} - \varepsilon/3.$$

Из неравенства (5) получим, что и

$$(p_n (\chi_D |y|^p))_{in} \geq (\|y\| - \varepsilon/6)^p (p_n \chi_D)_{in} \geq (\|p_n y\|_n - \varepsilon/6)^p (p_n \chi_D)_{in},$$

$$i=1, \dots, n, \text{ и}$$

$$\sum_{i=1}^n (p_n (\chi_D |y|^p))_{in} m_{in} \geq (\|p_n y\|_n - \varepsilon/6)^p \sum_{i=1}^n (p_n \chi_D)_{in} m_{in}.$$

Ясно, что  $\sum_{i=1}^n (p_n \chi_D)_{in} m_{in} \rightarrow m(D)$  при  $n \rightarrow \infty$  (сходимость  $\|p_n y\|_{n,1} \rightarrow \|y\|_1$ ).

Возьмем  $n_5$  настолько большим, что

$$^{1/2}m(D) \leq \sum_{i=1}^n (p_n \chi_D)_{in} m_{in} \leq 2m(D) \quad \text{при } n \geq n_5.$$

Тогда и

$$(^{1/2}m(D))^{1/p} \leq \left( \sum_{i=1}^n (p_n \chi_D)_{in} m_{in} \right)^{1/p} \leq (2m(D))^{1/p}. \quad (6)$$

Возьмем теперь  $p_4$  настолько большим, что

$$(^{1/2}m(D))^{1/p} \geq 1 - \varepsilon/15 \quad \text{при } p \geq p_4. \quad (7)$$

Аппроксимируем функцию  $\psi(s) = \chi_D(s) |y(s)|^p$  (как функцию из  $L^1(S, \Sigma, m)$ ) непрерывной функцией  $\varphi(s)$  вида  $\varphi(s) = z(s) |y_c(s)|^p$ , где  $y_c(\cdot) \in C(S)$ ,  $z(\cdot) \in C(S)$ ,  $0 \leq z(s) \leq 1$ ,  $s \in S$ , и

$$\int ||y(s)|^p - |y_c(s)|^p| m(ds) \leq \varepsilon/60,$$

$$\int |\chi_D(s) - z(s)| m(ds) \leq \varepsilon/(60 \sup_{s \in S} |y_c(s)|^p).$$

Тогда

$$\begin{aligned} & \int |\chi_D(s)| |y(s)|^p - z(s) |y_c(s)|^p m(ds) \leq \\ & \leq \int |\chi_D(s)| [|y(s)|^p - |y_c(s)|^p] m(ds) + \\ & + \int ||y_c(s)|^p [\chi_D(s) - z(s)] m(ds) \leq \\ & \leq \int ||y(s)|^p - |y_c(s)|^p m(ds) + \\ & + \sup_{s \in S} |y_c(s)|^p \int |\chi_D(s) - z(s)| m(ds) \leq 2\varepsilon/60. \end{aligned}$$

Тогда при  $n \geq n_6$  имеем

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{i=1}^n (p_n(\chi_D | y|^p))_{in} m_{in} - \sum_{i=1}^n (p_n(z | y_c|^p))_{in} m_{in} \right| \leq \\ & \leq \sum_{i=1}^n \int |\chi_D(s)| |y(s)|^p - z(s) |y_c(s)|^p m(ds) \frac{m_{in}}{m(A_{in})} \leq \\ & \leq \int |\chi_D(s)| |y(s)|^p - z(s) |y_c(s)|^p m(ds) \leq 3\varepsilon/60. \end{aligned}$$

Но для непрерывной функции  $z(s) |y_c(s)|^p$  мы имеем право использовать и эквивалентную [1] систему  $P = \{p_n\}$  систему связывающих операторов  $P' = \{p'_n\}$  в виде

$$(p'_n(z | y_c|^p))_{in} = z(s_{in}) |y_c(s_{in})|^p,$$

где  $s_{in}, i=1, \dots, n$ , точки из (2).

Следовательно, при  $n \geq n_7$

$$\sum_{i=1}^n |(p_n(z | y_c|^p))_{in} - (p'_n(z | y_c|^p))_{in}| m_{in} \leq \varepsilon/60$$

и при  $n \geq \max\{n_6, n_7\}$  имеем

$$\sum_{i=1}^n |(p_n(\chi_D | y|^p))_{in} - (p'_n(z | y_c|^p))_{in}| m_{in} \leq 4\varepsilon/60.$$

Но для функции  $z(s) |y_c(s)|^p$  справедливо

$$(p'_n(z | y_c|^p))_{in} = (p'_n z)_{in} | (p'_n y_c)_{in} |^p.$$

Следовательно,

$$\sum_{i=1}^n |(p_n(z | y_c|^p))_{in} - (p'_n z)_{in} | (p'_n y_c)_{in} |^p m_{in} \leq 4\varepsilon/60.$$

Возьмем теперь индекс  $n_8$  настолько большим, что при  $n \geq n_8$

$$\sum_{i=1}^n |(p_n z)_{in} | (p_n y_c)_{in} |^p - (p'_n z)_{in} | (p'_n y_c)_{in} |^p m_{in} \leq \varepsilon/60.$$

Следовательно, существует индекс  $n_9 = \max\{n_6, n_7, n_8\}$  такой, что

$$\sum_{i=1}^n |(p_n(\chi_D | y|^p))_{in} - (p'_n z)_{in} | (p_n y_c)_{in} |^p m_{in} \leq 5\varepsilon/60.$$

Тогда при  $n \geq n_9$

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n (p'_n z)_{in} | (p_n y_c)_{in} |^p m_{in} \geq \\ & \geq (\|p_n y\|_n - \varepsilon/6) \sum_{i=1}^n (p_n \chi_D)_{in} m_{in} - 5\varepsilon/60. \end{aligned}$$



Тем более (так как  $0 \leq (p'_n z)_{in} \leq 1, i=1, \dots, n$ )

$$\sum_{i=1}^n |(p_n y_c)_{in}|^p m_{in} \geq (\|p_n y\|_n - \varepsilon/6)^p \sum_{i=1}^n (p_n \chi_D)_{in} m_{in} - 5\varepsilon/60.$$

Взяв индекс  $n_{10}$  таким, что при  $n \geq n_{10}$  имеем

$$\left| \sum_{i=1}^n [|(p_n y_c)_{in}|^p - |(p_n y)_{in}|^p] m_{in} \right| \leq \varepsilon/60,$$

получим, что при  $n \geq n_{11} = \max \{n_6, \dots, n_{10}\}$

$$\sum_{i=1}^n |(p_n y)_{in}|^p m_{in} \geq (\|p_n y\|_n - \varepsilon/6)^p \sum_{i=1}^n (p_n \chi_D)_{in} m_{in} - 6\varepsilon/60.$$

Теперь из (6) и (7) получим, что при  $n \geq \max \{n_5, n_{11}\}$  и  $p \geq p_4$

$$\left( \sum_{i=1}^n |(p_n y)_{in}|^p m_{in} \right)^{1/p} \geq (\|p_n y\|_n - \varepsilon/6) - \varepsilon/15 - \varepsilon/10 = \|p_n y\|_n - \varepsilon/3.$$

Возьмем в качестве  $n_4$  теперь  $n_4 = \max \{n_5, n_{11}\}$ .

Взяв  $p_2 \in \max \{p_3, p_4\}$ ,  $n_2 = \max \{n_3, n_4\}$ , получим, что при  $p \geq p_2$  и  $n \geq n_2$

$$\|\|p_n y\|_{n,p} - \|p_n y\|_n\| \leq \varepsilon/3.$$

Тогда при  $n \geq \max \{n_1(p_1), n_2\}$

$$\|y\| - \|p_n y\|_n \leq \varepsilon.$$

Предложение доказано.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Вайникко Г. Анализ дискретизационных методов. Тарту, Изд-во Тартуск. ун-та, 1976.
2. Köthe, G. Topological Vector Spaces. I. Berlin—Heidelberg—New York, Springer Verlag, 1983.

Институт кибернетики  
Академии наук Эстонской ССР

Поступила в редакцию  
5/V1987

R. LEPP

## OLULISELT TÖKESTATUD FUNKTSIOONIDE RUUMI DISKREETSE LÄHENDAMISE TINGIMUSED

On defineeritud oluliselt tõkestatud funktsioonide ruumi ja lõplikumõõtmeliste vektorite ruumi ühendav, tükati integraalne lineaarne sideoperaator. On esitatud piisavad tingimused, et oluliselt tõkestatud funktsioonide ruum oleks lähendatav lõplikumõõtmeliste vektorite ruumi kasvava jadaga.

R. LEPP

## DISCRETE APPROXIMATION CONDITIONS FOR THE SPACE OF ESSENTIALLY BOUNDED FUNCTIONS

A linear piecewise integral connection operator between the space of essentially bounded functions and the space of finite-dimensional vectors is defined. Sufficient conditions that guarantee approximation of the space of essentially bounded functions by the increasing sequence of finite-dimensional spaces are presented.