

УДК 519.644

А. МАРШАК

ЗАМЕЧАНИЕ О КВАДРАТУРНОЙ ФОРМУЛЕ КЛЕНШОУ—КУРТИСА

4. MARSAK. MÄRKÜS CLENSHAW—CURTISE KVADRATUURVALEMI KOHTA

4. MARSHAK. A REMARK ON CLENSHAW—CURTIS QUADRATURE RULE

(Представил Г. Кузмин)

В данной заметке рассматриваются квадратурные формулы (КФ) Кленшоу—Куртиса, отображенные на $[0, 1]$, а именно $[1, 2]^*$:

$$\int_0^1 f(\mu) d\mu \approx \sum_{j=1}^N a_j f(\mu_j), \quad N - \text{чётное}, \quad (1)$$

$$\begin{cases} \mu_j = \sin^2(\pi j/2N), & j=1, 2, \dots, N, \\ a_j = (2/N) \sum_{i=0}^{N/2} (1-4i^2)^{-1} \cos(2ij\pi/N), & j=1, 2, \dots, N-1, \\ a_N = 0,5/(N^2-1). \end{cases} \quad (2)$$

Покажем, что узлы и веса КФ $\{(1), (2)\}$ удовлетворяют условию **

$$\sum_{j=1}^l a_j \mu_j^{i-1} = (\mu_{l+1}^i + \mu_l^i)/2i + O(\mu_l) \mu_l^{i-1}, \quad l=1, 2, \dots, N, \\ i=1, 2, \dots; \mu_{N+1}=1. \quad (3)$$

Заметим, что это условие означает, что сумма $\sum_{j=1}^l a_j \mu_j^{i-1}$ должна находиться «недалеко» от середины интервала $(\int_0^{\mu_l} \mu^{i-1} d\mu, \int_0^{\mu_{l+1}} \mu^{i-1} d\mu)$.

Для класса КФ, удовлетворяющих (3), можно получить нестандартную форму остаточного члена, которая учитывает сильную неравномерность расположения узлов КФ (например, сгущение к левому концу отрезка интегрирования).

1. КФ Кленшоу—Куртиса и ее предельный случай. Параллельно с КФ $\{(1), (2)\}$ рассмотрим ее предельный случай $[2]$

$$\begin{cases} \bar{\mu}_j = \mu_j, & j=1, 2, \dots, N, \\ \bar{a}_j = (\pi/2N) \sin(\pi j/N), & j=1, 2, \dots, N-1, \quad \bar{a}_N = a_N. \end{cases} \quad (4)$$

* Знак Σ'' означает, что первый и последний член суммы взяты с коэффициентом 0,5.

** Запись $A_n = O(B_n)$, где $B_n > 0$, $n=1, 2, \dots$ означает, что последовательность A_n/B_n при $n \rightarrow \infty$ ограничена.

Посмотрим, насколько КФ $\{(1), (4)\}$ отличается от КФ $\{(1), (2)\}$, г. е. оценим разность $\bar{a}_j - a_j, j=1, 2, \dots, N-1$.

Лемма 1. Для любого $t \in (0, \pi)$ справедливо асимптотическое равенство

$$\sum_{k=M+1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)t}{2k-1} = (\sin t)^{-1} \left\{ -\frac{\sin^2 Mt}{2M+1} + \frac{1}{2(2M+1)} + \right. \\ \left. + \frac{\sin(2M+1)t}{2 \sin t (2M+1)(2M+3)} - \frac{\cos(2M+2)t}{\sin^2 t (2M+1)(2M+3)(2M+5)} + \right. \\ \left. + O(M^{-4} \sin^{-3} t), \right.$$

где $M=1, 2, \dots$

Доказательство леммы основывается на технике, предложенной в [3], с. 535.

Используя результат леммы 1 для остатка ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)t}{2k-1} = \pi/4, \quad t \in (0, \pi),$$

и преобразуя веса (2) согласно [2], можно показать, что имеет место

Лемма 2. Для определенных в (2) и (4) весов КФ (1) справедливо равенство

$$\bar{a}_j - a_j = (1-)^s \sin^{-2}(\pi j/N) [(N-1)(N+1)(N+3)N]^{-1} + \\ O(\sin^{-3}(\pi j/N)N^{-5}).$$

2. Равносильность условий. Непосредственная проверка условия (3) довольно трудоемка. Оказывается, что справедлива

Лемма 3. Для того, чтобы узлы и веса КФ (1) удовлетворяли условию (3), необходимо и достаточно, чтобы они удовлетворяли равенствам

$$\begin{cases} \alpha_1 \mu_1^{i-1} - (\mu_2^i + \mu_1^i)/2i = \mu_1 c_1^{N,i}, & j=1, \\ \alpha_j \mu_j^{i-1} - (\mu_{j+1}^i - \mu_{j-1}^i)/2i = \mu_j c_j^{N,i}, & j=2, 3, \dots, l, \end{cases} \quad (5)$$

где величины $c_j^{N,i}$ таковы, что

$$\sum_{j=1}^l c_j^{N,i} = O(\mu_l^{i-1}); \quad l=1, 2, \dots, N, \quad i=1, 2, \dots \quad (6)$$

Достаточность доказывается путем непосредственного сложения правых и левых частей равенств (5). Для доказательства необходимости можно провести индукцию.

3. Проверка условий (5)–(6). Сформулируем две леммы.

Лемма 4. Пусть a и b некоторые действительные числа. Тогда при всех $k=2, 3, \dots$ справедливо равенство

$$\sum_{i=1}^k (a+b)^{2k-2i} (a-b)^{2i-2} = k(a^{2k-2} + b^{2k-2}) + \sum_{m=1}^{k-2} d_{k,m} a^{2k-2m-2} b^{2m},$$

где

$$d_{k,m} = \sum_{i=1}^k \sum_{l=0}^{2m} (-1)^l c_{2k-2i}^{2m-l} c_{2i-2}^l, \quad m=0, 1, \dots, k-1.$$

(Здесь c_k^i — биномиальные коэффициенты.)

Лемма 5. Пусть $a = \pi/2N$. Тогда справедливо асимптотическое равенство

$$a \sum_{j=1}^l \sin^k aj \cos^m aj = O(\sin^{k+1} al),$$

$$k=1, 2, \dots, \quad m=1, 2, \dots, \quad l=1, 2, \dots, N,$$

С помощью лемм 4 и 5 можно показать, что КФ $\{(1), (4)\}$ удовлетворяет условиям (5)—(6), а отсюда, ввиду равносильности условий (3) и (5)—(6) (лемма 3), следует

Теорема 1. Узлы и веса КФ $\{(1), (4)\}$ удовлетворяют условию (3).

Используя лемму 2, этот результат можно перенести и на КФ $\{(1), (2)\}$, а именно

Теорема 2. Узлы и веса КФ Кленшоу—Куртиса удовлетворяют условию (3).

ЛИТЕРАТУРА

1. El-Gendi, S. E. Comput. J., № 12, 282—287 (1969).
2. Imhof, I. P. Numer. Math., № 5, 138—141 (1963).
3. Тиман А. Ф. Теория приближения функции действительного переменного. М., Физматгиз, 1960.

Институт астрофизики и физики атмосферы
Академии наук Эстонской ССР

Поступила в редакцию
10/XI 1985

Переработанный вариант
21/II 1986